

- **Menor riesgo de padecer cáncer de pene.** Si bien el cáncer de pene es poco frecuente, es menos común en los hombres circuncidados. Asimismo, el cáncer del cuello del útero es menos frecuente en las parejas sexuales femeninas de los hombres circuncidados.



- **La circuncisión no afecta la fertilidad** y, en general, no se cree que aumente o disminuya el placer sexual para los hombres o sus parejas.

## RIESGOS

- Las complicaciones son raras, sin embargo, puede presentarse sangrado e infección.

## DESPUÉS DEL PROCEDIMIENTO

Por lo general, la cicatrización del pene lleva entre 7 y 10 días. Se puede sentir molestia en la punta del pene al principio, sin embargo, la piel se va adaptando conforme pasen los días.




f UROVAN - Urología de Vanguardia

📷 @urovan\_urologiadevanguardia

📞 954 073 510 / 987 332 142 / 959 453 838



# CIRCUNCISIÓN




## DESCRIPCIÓN GENERAL

Es la extirpación quirúrgica de la piel que cubre la punta del pene.

Es un procedimiento ambulatorio que se puede realizar con anestesia local sin problemas.


El procedimiento también puede ser un tema de tradición familiar, higiene personal o cuidado preventivo de la salud.



## ¿EN QUIENES ESTÁ INDICADA LA CIRCUNCISIÓN?

- En los hombres que presentan balanitis (inflamación del glande) o infecciones prepuciales de manera reiterada.
- Cuando al varón le resulta difícil o imposible deslizar hacia abajo la piel que rodea al glande, un trastorno que se conoce como fimosis y es más frecuente en los niños pequeños, pero que puede aparecer a cualquier edad.
- La presencia de parafimosis (atrapamiento del glande por el anillo fimótico).
- Puede realizarse como una opción de tratamiento en pacientes que padecen de eyaculación precoz.
- Pacientes que deseen prevenir enfermedades de transmisión sexual y mejorar higiene.

## ¿QUÉ BENEFICIOS BRINDA?



- **Higiene más sencilla.** La circuncisión hace que sea más simple lavar el pene.
- **Menor riesgo de padecer infecciones urinarias.** El riesgo de padecer de infecciones urinarias en hombres es bajo; sin embargo, estas infecciones son más frecuentes en los hombres no circuncidados.
- **Menor riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual.** Los hombres circuncidados podrían tener un menor riesgo de contraer ciertas infecciones de transmisión sexual, como VIH. Igualmente, las prácticas sexuales seguras siguen siendo esenciales.